

Silimarina 150mg (10 blistere x 10 comprimate)

Protejează ficatul împotriva agenților nocivi: medicamente, alcool, tutun, toxine. Este indicat persoanelor cu sensibilitate la substanțe chimice.

Ingrediente / comprimat	Extract uscat din fructe de Armurariu (<i>Silybum marianum</i>) - corespunzător la 150 mg silimarina
Mod de utilizare	Se administrează oral, câte 1 comprimat de 2 ori pe zi, timp de 3-6 săptămâni. Administrarea se poate repeta după o pauză de 1-2 săptămâni.
Informații despre produs	Extractul uscat din fructe de Silybum marianum (Armurariu) are ca substanță bioactivă silimarina - un complex de flavonoide format în principal din silibină, silidianină și silicristină. Silimarina stimulează sinteza de proteine și susține refacerea celulei hepatice lezate, precum și apariția de celule noi. Silimarina protejează integritatea membranei celulare hepatice, împiedicând pătrunderea în celulă a unor substanțe hepatotoxice (alcool etilic, medicamente hepatotoxice, alte toxine). Datorită efectului de fluidizare și de stimulare a eliminării secreției biliare, reduce riscul apariției calculilor biliari și favorizează digestia. Silimarina este un produs natural foarte bine tolerat de organism.
Atenționări	Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos. Suplimentul este contraindicat persoanelor alergice la oricare dintre ingredientele produsului. În cazul unor afecțiuni cronice sau al urmării unui tratament medicamentos, sfatul medicului este absolut necesar înaintea administrării acestui produs. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, ferit de umiditate și lumină. Nu este recomandat persoanelor cu intoleranță la lactoză. Contraindicat copiilor, femeilor însărcinate (primul trimestru), precum și în caz de chist ovarian, endometrită, ciroză decompensată. A se administra cu prudență femeilor care alăptează și persoanelor hipoglicemice/diabetice. A nu se administra concomitent cu contraceptive orale sau cu unele medicamente antiinfecțioase (de ex. Metronidazol).